

# Costo y consumo de recursos de pacientes posterior a Enfermedad Cerebrovascular isquémica

Jose Alejandro Mendoza<sup>1</sup>, Federico A Silva<sup>1</sup>, Jaime Ernesto Arias<sup>1</sup>, Marlen Yovana Pachón<sup>1</sup>, Carlos Ortiz<sup>1</sup>. Fundación Cardiovascular de Colombia y Cardiecol.

## INTRODUCCIÓN

Los pacientes sobrevivientes a un Evento Cerebrovascular afrontan gastos en el momento del evento y posterior principalmente en bienes no incluidos en el plan obligatorio de salud. Estos gastos son una barrera de acceso y pueden llevar a una debacle económica familiar, por lo que es importante conocerlos.

Los costos directos no médicos, que en nuestro medio son gastos de bolsillo (GB), no son rutinariamente evaluados por los entes de salud en parte por la dificultad en la obtención de este tipo de información y/o por qué no son reembolsados (6). Colombia es uno de los países con menor gasto de bolsillo de la región; esto según algunos autores se debe en parte a: buena cobertura en salud y/o por falta de dinero en el hogar para gastar en salud (4,5). Más aún, los gastos de bolsillo son reconocidos como una barrera de acceso a los servicios de salud

## METODOLOGÍA

Se recolectó información de 67 pacientes incluidos desde noviembre de 2015 hasta noviembre de 2016 en una cohorte observacional de pacientes con enfermedad cerebrovascular. Se aplicó un formulario diseñado en el que se interrogó sobre gastos y uso de servicios médicos y no médicos en el momento de la hospitalización y posterior.

## RESULTADOS


En promedio, el gasto de bolsillo de los pacientes fue de \$887.676 COP debido en mayor parte al pago de estadía en la ciudad \$355.000 COP, costo de cama hospitalaria \$1.453.600COP y costo de las adecuaciones en el hogar \$1.684.545COP. El 74% de los pacientes realizaron algún pago durante la hospitalización y un 56.7% posterior al alta.

De los gastos posteriores al ECVI agudo, 56.7% realizaron algún pago posterior al alta. El 20.9% (14) de los pacientes realizaron adecuación en el hogar (cambios en habitaciones, adecuaciones en el baño, etc.) que fue el costo medio más alto \$ 1'684.545 COP seguido de compra o alquiler de cama hospitalaria (7,5%) con costo promedio de \$1.453.600 COP. El gasto más frecuente fue el pago de alimentación especial 25.4% (17) con costo promedio de \$72.142 COP.


## OBJETIVOS

Describir los costos y el consumo de recursos de pacientes posterior a Enfermedad Cerebrovascular isquémica en Colombia

### Prueba Kruskal-Wallis de muestras independientes



### Prueba Kruskal-Wallis de muestras independientes



## CONCLUSION

Los pacientes sobrevivientes a ACV y sus cuidadores tienen que afrontar gasto de bolsillo por bienes y servicios propios de la enfermedad que no son cubiertos por el plan obligatorio de salud. Es necesario investigar el gasto de bolsillo catastrófico en esta población y abrir el debate sobre la financiación a poblaciones de escasos recursos de servicios no incluidos en el plan obligatorio de salud

## REFERENCIAS